



VIRBAC MILPRO® 2,5 MG/25

Milbemicina oxima 2,5 mg + Praziquantel 25 mg.

Antiparasitario – Comprimido Oral.

REG. SAG N° 2416 – B

COMPOSICION

Cada comprimido contiene

Milbemicina oxima

2,5 mg

Praziquantel

25 mg

Excipientes c.s.p.

1 Comprimido



Antiparasitario

ESPECIE DE DESTINO

Perros (cachorros y razas pequeñas).

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de la infestación endoparasitaria mixta de cestodos (*Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., y *Echinococcus* spp.) y nematodos (*Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* y *Trichuris vulpis*), en cachorros y razas pequeñas entre 0,5 y 10 kg de peso.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

La dosis corresponde a 0,5 mg de Milbemicina oxima y 5 mg de Praziquantel/kg peso corporal. La dosis de producto según peso del perro, es la siguiente:

Peso (KG)	Nº de comprimidos
0,5 - 1Kg	1/2 comprimido
1,1 - 5 Kg	1 comprimido
5,1 - 10Kg	2 comprimidos

La frecuencia de administración es en dosis única de tratamiento.

Vía de administración: Vía oral

Modo de empleo:

Se debe administrar la cantidad necesaria de comprimidos, de acuerdo al peso del animal, en una sola toma y en conjunto o posterior a la comida.

Los comprimidos contienen un sabor a carne y de fácil administración, y tanto perros como cachorros, usualmente aceptan de forma voluntaria el comprimido (incluso sin comida).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

En la raza Collie o sus mezclas el margen de seguridad para Milbemicina oxima es más estrecho en comparación a otros perros, por lo que se debe seguir estrictamente la dosis recomendada de uso en este caso.

Ante la ausencia de estudios específicos, no se recomienda su uso en perros severamente debilitados ni con grave disfunción hepática o renal.

CONTRAINDICACIONES

No usar en cachorros menores a 2 semanas de edad, ni cachorros o perros con un peso menor a 0,5 kg.

No administrar a animales hipersensibles a Milbemicina oxima o Praziquantel.

En virtud a que no se ha estudiado la tolerancia del medicamento en cachorros de raza Collie o mestizos de esta, no administrar en cachorros de esta raza o mestizos de ésta.

No administrar en periodo de gestación, lactancia, ni en animales reproductores.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

En muy raras ocasiones, signos de tipo sistémicos (como: letargia), neurológicos (como: tremor muscular y ataxia), y/o gastrointestinales (como: vómitos, diarrea, anorexia y babeo), podrían observarse posterior a la administración.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

En caso de utilizar ½ comprimido, mantener la otra mitad dentro de su envase original, a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C), hasta su próximo uso y por un periodo máximo de 6 meses.

PRESENTACION

Estuche conteniendo 1 blíster de 2 comprimidos.

Venta Bajo Receta Medico Veterinaria.

USO VETERINARIO

FT0178NAC02052024R1V2

Fabricado en Francia por Virbac S.A.
1ère avenue 2065 m LID, 06510 (Carros – Francia).

Importado y distribuido en Chile por:

Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos – Santiago.
www.virbac.cl
Bajo licencia de Virbac S.A., Francia.

