



CENTROVET
Ciencia en Salud Animal®

CANIGEN® MHA₂PPi/L

Vacunas – Séxtuple canina

Reg. SAG N° 307-B

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus Distemper Canino atenuado, Cepa Lederle
Adenovirus Canino Tipo 2 atenuado, Cepa Manhattan
Parvovirus Canino atenuado (CPV), Cepa 780916
Virus Parainfluenza Canina atenuado, Cepa Manhattan
Leptospira canicola inactivada, Cepa Mailoux
Leptospira icterohaemorrhagiae inactivada, Cepa ATCC23581
Excipientes c.s.p.

10³ - 10⁵ CCID₅₀
10⁴ - 10⁶ CCID₅₀
10⁵ - 10⁷ CCID₅₀
10⁵ - 10⁷ CCID₅₀
≥ 80% de protección
≥ 80% de protección
1 mL

ESPECIES DE DESTINO

Perros

INDICACIONES DE USO

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de enfermedades causadas por el virus Distemper Canino, Adenovirus Canino tipo 1 (Hepatitis), Adenovirus Canino tipo 2 (enfermedad respiratoria), virus de la Parainfluenza Canina, Parvovirus Canino y Leptospirosis causada por *Leptospira canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Inocular por vía subcutánea, 1 mL de la suspensión final.

Primovacunación: Debe practicarse en 2 inyecciones de una dosis, separadas por un intervalo de 3 a 4 semanas, en animales de 8 o más semanas de edad.

Se aconseja revacunación anual con 1 dosis.

Reconstituir la fracción liofilizada con la suspensión líquida, y administrar en forma aséptica utilizando jeringas estériles.

Agitar antes de usar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Vacunar únicamente perros en buen estado de salud y correctamente desparasitados.

CONTRAINDICACIONES

No vacunar hembras preñadas o lactantes.

No vacunar perros menores de 8 semanas de edad.

EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Posterior a la administración de la primera dosis, los animales pueden presentar un aumento de volumen local y transitorio en el sitio de aplicación.

Luego de la segunda y subsecuentes administraciones, la incidencia de esta reacción disminuye marcadamente.

En casos muy raros puede presentarse dolor y prurito, sin embargo, estas reacciones pequeñas y transitorias en el sitio de inyección resuelven espontáneamente.

En casos muy raros la vacunación puede inducir diarrea, hipertermia o debilidad transitoria.

Reacciones de hipersensibilidad pueden ocurrir.

En caso de reacciones alérgicas o anafilácticas, debe administrarse un tratamiento sintomático apropiado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar.

PRESENTACIÓN

Envase con 10 dosis unitarias.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

Fabricado por
Virbac S.A.
13ème Rue LID O6517 Carros
Cedex - Francia

Importado y distribuido por
Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago, Chile
Teléfono: (56 2) 2583 7700 / Fax (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com
Bajo licencia de Virbac S.A., Francia.

FT0114NAC18072019R1V1



VACUNAS