

# EHLIFLOXACINO® 50mg

Antibióticos - Comprimidos Orales

REG. SAG N° 1391

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Enrofloxacinó 50 mg  
Excipientes c.s.p. 1 Comprimido

## ESPECIES DE DESTINO

Perros y Gatos.

## INDICACIONES DE USO

Enrofloxacinó presenta amplia actividad contra bacterias Gram negativas y Gram positivas, indicándose para el tratamiento de infecciones bacterianas de los sistemas:

Respiratorio: causadas por *Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., y *Klebsiella* spp.

Gastrointestinal: causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., y *Proteus* spp.

Urogenital (nefritis, pielonefritis, cistitis y prostatitis): causadas por *Escherichia coli*, *Corynebacterium piogenes*, y algunas cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., y *Pseudomonas aeruginosa*.

Infecciones cutáneas (como dermatitis, piodermas y heridas infectadas): causadas por *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., y algunas cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., y *Pseudomonas aeruginosa*.

Infecciones del conducto auditivo (otitis): causadas por *Escherichia coli* y algunas cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., y *Pseudomonas aeruginosa*.

## DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

5 mg de Enrofloxacinó/kg de peso corporal/24 horas (equivalente a 1 comprimido de Ehlifloxacinó® 50 mg/10 kg de peso corporal/24 horas), o 2,5 mg de Enrofloxacinó/kg de peso corporal/12 horas (equivalente a ½ comprimido de Ehlifloxacinó® 50 mg/10 kg de peso corporal/12 horas), durante 5 a 14 días.

En infecciones complicadas o crónicas, susceptibles a Enrofloxacinó, el tratamiento puede extenderse por varias semanas.

Vía de administración: Vía oral.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

El uso de Fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido de forma escasa, o cuando se espera que no respondan a otra clase de antimicrobiano.

Las Fluoroquinolonas no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, a menos que esté justificado. Sólo deben utilizarse, en lo posible, en base a pruebas de susceptibilidad.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las Quinolonas.

No administrar en perros de razas pequeñas y medianas, menores de 12 meses de edad.

No administrar en perros de razas grandes, menores de 18 meses de edad.

No administrar en gatos menores de 8 semanas de edad.

No emplear en animales con trastornos del cartílago articular.

No utilizar en animales con afecciones del sistema nervioso central, ni con daño hepático o renal severo.

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

## PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo un blíster con 10 Comprimidos Orales.

## USO VETERINARIO

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida**



Antibióticos

