

ENROMIC® 20%

Antibióticos - Solución Oral

Reg. SAG N° 2255

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Enrofloxacinó 20 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Pollos broiler y Pollas de reemplazo.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de infecciones causadas principalmente por bacterias Gram negativas (como: *Escherichia coli*, *Pasteurella* sp. y *Salmonella* sp.) y *Mycoplasma* sp., sensibles a enrofloxacinó.

DOSIFICACIÓN Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

10 mg de enrofloxacinó/kg peso vivo/día (equivalente a 0,05 mL de Enromic® 20% solución oral/ kg peso vivo), por 3 a 5 días.

Vía de administración: Vía oral, en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños

No administrar en animales con conocida hipersensibilidad a las quinolonas.

No emplear en animales con trastornos en el cartílago articular.

No administrar en conjunto con AINES.

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 10 días.

No administrar a aves cuyos huevos se destinen a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 500 mL, 1000 mL, 5 L y 20 L.



FT0051NAC07062019R1V1

