

# ISOEUGENOL 50%

## Anestésico – Solución para inmersión

Reg. SAG N° 1950

### COMPOSICIÓN

Cada 100 mL producto contiene:  
Isoeugenol 50 g  
Excipientes c.s.p. 100 mL

### ESPECIES DE DESTINO

Salmónidos.

### INDICACIONES DE USO

Indicado como anestésico de salmones y truchas, para facilitar el manejo de los peces en operaciones de rutina en la acuicultura, tales como: transporte, vacunación, desove, aplicación de medicamentos, clasificación, muestreo, pesaje y/o medición, entre otros.

### DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

#### Dosificación:

13 mg de isoeugenol/Litro de agua (equivalente a 0,026 mL de Isoeugenol 50%/Litro de agua).

**Vía de administración:** Baño de inmersión.

#### Modo de empleo:

- Prepare una solución stock de trabajo 1:10, con 26 mL del producto Isoeugenol 50% (Solución para inmersión) mezclado en 234 mL de agua fresca (idealmente no salada), totalizando 260 mL de solución con anestésico.
- Desde esta solución stock de trabajo, utilice 26 mL directamente en el agua por cada 100 Litros (equivalente a 13 mg de isoeugenol/Litro de agua).
- Mantenga los peces en este baño de inmersión anestésica no más de 12 a 15 minutos.
- Posteriormente traslade los peces a agua fresca y libre de anestésico.
- Los peces se recuperan de la anestesia al cabo de 8 a 12 minutos post-exposición.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

#### Mantener fuera del alcance de los niños

No exponer a los peces a la luz solar directa ni al viento.

Evitar el estrés de los peces antes del tratamiento.

Airear el agua con oxígeno o aire para mantener la concentración de oxígeno disuelto.

La temperatura y el pH del agua deben encontrarse dentro del 85% de los valores para los cuales los peces han sido climatizados.

La temperatura del agua debiese estar idealmente alrededor de los 13 ° C para una aplicación durante 15 minutos.

No eliminar el agua con anestésico en lagunas o tranques donde no hay dilución.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

### PERIODO DE RESGUARDO

Cero (0) días.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

### USO VETERINARIO

### PRESENTACIÓN

Frasco de 1 L y Bidón de 5 L.

