

POLIFEN® 7%

Ácido acético + Colorante verde DLC-1565
Solución Tópica



SOLUCIÓN TÓPICA

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Ácido acético 7 g
Excipientes y colorante verde DLC c.s.p. 100 mL

INDICACIÓN DE USO

Polifen® 7% está especialmente indicado para ser aplicado sobre los peces muertos (salmones, truchas) y gametos que son eliminados en la Industria Salmonera, antes de ser enviado a planta reductora.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Los peces muertos y gametos eliminados en los centros de cultivo, deben ser recolectados y depositados en bins identificados y aplicar rápidamente Polifen® 7%.

La dosis recomendada es de 50 mL de Polifen® 7% por cada kilogramo de mortalidad de peces o gametos eliminados.

Finalmente cuando el bins es llenado, debe ser sellado y enzunchado para su posterior retiro por la planta reductora.

PRECAUCIONES PARA EL OPERADOR

Utilizar ropa protectora, guantes y lentes de seguridad.

No fumar, beber ni comer cuando utilice el producto.

Lavarse las manos cuidadosamente después de tener contacto con el producto.

En caso de contacto con la piel lave inmediatamente la zona afectada.

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y busque asistencia médica.

ADVERTENCIAS:

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener el envase bien cerrado, bajo 25 °C y protegido de la luz.

Almacenar en el envase original.

PRESENTACIÓN

Envases de 20 L.

USO INDUSTRIAL

FT0095NAC17062019R1V1

