

PEDEROL®

Clortetraciclina clorhidrato 2%

Antibióticos – Aerosol Tópico

REG. SAG N° 2070-B

COMPOSICIÓN

Cada g contiene:
Clortetraciclina clorhidrato 20 mg
(Equivalente a 18,6 mg de Clortetraciclina base)
Excipientes c.s.p. 1 g

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Cerdos y Caballos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de heridas quirúrgicas y superficiales. Coadyuvante en el tratamiento de la pododermatitis y otras infecciones podales causadas por gérmenes sensibles a Clortetraciclina: *Streptococcus* spp., *Haemophilus* spp., *Klebsiella* spp., *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp., *rickettsia* y *Chlamydia*s.

DOSIFICACIÓN, VÍA ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Prevía limpieza de la zona a tratar y eliminación de los tejidos necrosados, pulverizar la zona afectada con el brazo extendido hasta cubrir ésta. Si dentro de 48 horas no existen resultados, suspender el tratamiento y consultar con el Médico Veterinario.

Vía de administración: Tópica.

Modo de empleo:

Antes de la aplicación, limpiar la zona afectada, eliminando la suciedad y tejidos necrosados. Agitar el spray antes de usarlo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

No aplicar sobre los ojos, ya que puede aparecer una irritación local.

Evitar el contacto o lamido de la zona afectada durante 5 minutos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con historial de hipersensibilidad a las Tetraciclinas.

No administrar en periodo de gestación o lactancia.

No administrar en heridas en glándula mamaria.

No administrar en heridas abiertas, heridas graves o en focos purulentos.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Reacciones cutáneas locales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C) y al abrigo de la luz.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne y leche: Cero (0) días

PRESENTACIONES

Envases de 75 mL y 250 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO



Antibióticos

FT0147NAC01062020R2V1

