

TILOSINA 20%

Antibióticos - Solución Inyectable

REG. SAG N° 2050 - B

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contienen:

Tilosina base	20 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Cerdos y Perros.

INDICACIONES

Bovinos: Infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida* y *Manheimia haemolytica*.

Cerdos: Tratamiento de neumonía causada por *Pasteurella multocida* y tratamiento de artritis causada por *Mycoplasma hyosynoviae*.

Perros: Infecciones respiratorias (bronquitis, traqueo-bronquitis, traqueítis, laringitis, tonsilitis, neumonía causada por *P. multocida*).

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Bovinos: 20 mg/kg p.v. (Tilosina base) (equivalentes a 1 mL de Tilosina 20% por 10 kg de peso vivo) cada 24 horas durante 5 días.

Cerdos: 20 mg/kg p.v. (Tilosina base) (equivalente a 1 mL de Tilosina 20% por 10 kg de peso vivo) cada 24 horas durante 3 días.

Perros: 11 mg/kg p.v. (Tilosina base) (equivalente a 0,5 mL de Tilosina 20% por 10 kg de peso vivo) cada 24 horas durante 3 - 5 días.

Vía de administración: Intramuscular.

PERIODO DE RESGUARDO

Bovinos: 21 días.

Cerdos: 21 días.

No utilizar en vacas cuya producción de leche sea destinada a consumo humano.

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS ADVERSOS Y ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

No mezclar con otras soluciones medicamentosas, sobretodo acuosas, pues pueden dar lugar a la precipitación de la Tilosina.

No administrar junto con antibióticos bactericidas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN

Frascos de 20, 50 y 100 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

