

VETERIN® 10%

Florfenicol 10%

Antibióticos - Solución Oral

Reg. SAG N° 1559

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Florfenicol	10 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Aves (pavos y pollos broiler) y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de enfermedades infecciosas respiratorias causadas por agentes sensibles tales como *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp. y *Haemophilus* spp. en aves, y como *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis* y *Streptococcus suis* en cerdos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Aves:

20 - 30 mg de Florfenicol/ kg peso vivo/ día (equivalente a 0,2 - 0,3 mL de Veterin® 10%/ kg peso vivo/ día), durante 5 a 7 días.

Cerdos:

10 mg de Florfenicol/ kg peso vivo/ día (equivalente a 0,1 mL de Veterin® 10%/ kg peso vivo/ día), durante 5 días.

Vía de administración: Vía oral, en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños

No usar en animales con alguna alteración hepática o renal.

No usar en animales deshidratados o hipovolémicos por riesgo de toxicidad renal.

No administrar en animales con sensibilidad al principio activo.

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

No administrar en animales reproductores.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Pavos y pollos broiler: 30 días.

No utilizar en aves de postura cuyos huevos se destinen a consumo humano.

Cerdos: 30 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 1 L y 5 L.

