

VETERIN® 20%

Florfenicol 20%

Antibióticos – Polvo Oral

Reg. SAG N° 1804

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Florfenicol	20 g
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de patologías producidas por bacterias Gram negativas y Gram positivas, tales como: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Streptococcus suis*, *Haemophilus* spp., *Mycoplasma* spp., y *Lawsonia intracellularis*.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Enfermedades respiratorias: 10 mg de Florfenicol/kg peso vivo/día (equivalente a 1 kilo de Veterin® 20%/tonelada de alimento), por 5 días consecutivos.

Ileítis (*L. intracellularis*): 2 mg de Florfenicol/kg peso vivo/día (equivalente a 200 gramos de Veterin® 20%/tonelada de alimento), por 14 días consecutivos.

Vía de administración: Vía oral, en el alimento.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

No administrar en animales con sensibilidad al principio activo.

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

No administrar en animales reproductores.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 30 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 10 kg y 20 kg.

