VIROKILLER®

Cloramina T 80%

Polvo para reconstituir Solución para Inmersión

Antiséptico

REG. SAG Nº 1403

COMPOSICION

Cada 100 g de producto contienen:

Cloramina T (trihidrato)	80 g
(N° CAS 127-65-1)	
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES DE DESTINO

Salmónidos.

INDICACIONES DE USO

En piscicultura, se utiliza para el tratamiento de algunas enfermedades en peces, presentando acción bactericida, fungicida, viricida y sobre algunos parásitos.

Enfermedad Bacteriana de las Branquias (BGD) producida por *Flavobacterium branchiophilum*. Se alcanzan mejores resultados cuando el tratamiento se inicia en etapas tempranas del brote de BGD.

Punto Blanco producido por *Ichthyophthirius multifiliis*. Se recomienda comenzar el tratamiento en etapas tempranas de la infección. El tratamiento puede detenerse una vez que los peces alcanzan inmunidad contra Ictiofiriasis.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación y modo de empleo:

Enfermedad Bacteriana de las Branquias producida por *Flavobacterium branchiophilum*: Se utiliza como baño, una vez al día, en una concentración de 8 a 15 ppm (10 a 19 g de Virokiller® por 1.000 litros de agua) por una hora. El tratamiento puede ser repetido por 2 a 3 días consecutivos. No superar los 40 kg/m^3 de biomasa.

Punto Blanco producido por *Ichthyophthirius multifiliis*: Se utiliza como baño en una concentración de 12 ppm (15 g de Virokiller® por cada 1.000 litros de agua) por una hora. El tratamiento debe repetirse 3 a 4 veces con intervalo de 1 semana. No superar los 40 kg/m^3 de biomasa.

Vía de administración: Baño de inmersión.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evite que el pH del agua baje (pH ≤ 6.5), ya que podría aumentar la toxicidad del producto.

Se recomienda el tratamiento de un pequeño número de peces antes del tratamiento general, y mantener la oxigenación del agua dentro de parámetros normales.

Utilizar inmediatamente una vez reconstituido. Desechar la solución sobrante.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en aguas ácidas, o disminuir la concentración a utilizar.

No utilizar en reproductores.

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún otro producto farmacéutico.

EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

A las dosis recomendadas no se esperan efectos adversos, sin embargo, podrían observarse aletas erosionadas o deshilachadas, como también comportamiento anormal asociado a distrés respiratorio debido a cambios en la mucosa branquial.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

50 grados día.

PRESENTACIÓN

Balde con bolsa interior, conteniendo 5 kg de producto.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

FT0087NAC16032023R2V3

Fabricado y comercializado en Chile por Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovet@centrovet.com; www.centrovet.com