

VIRBAC MILPRO® 12,5 MG/125 MG.

Milbemicina oxima 12,5 mg + Praziquantel 125 mg.

Antiparasitario – Comprimido Oral.

REG. SAG N° 2417 – B

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene
Milbemicina Oxima 12,5 mg
Praziquantel 125 mg
Excipientes c.s.p. 1 Comprimido

ESPECIE DE DESTINO

Perros.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de la infestación endoparasitaria mixta de cestodos (*Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., y *Echinococcus* spp.) y nematodos (*Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis* y *Trichuris vulpis*), en perros mayores a 5 kg.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

La dosis corresponde a 0,5 mg de Milbemicina oxima y 5 mg de Praziquantel/kg peso corporal. La dosis de producto según peso del perro, es la siguiente:

Peso (KG)	Nº de comprimidos
5 - 25 kg	1 comprimido
>25 - 50 kg	2 comprimidos
>50 - 75 kg	3 comprimidos

La frecuencia de administración es en dosis única de tratamiento.

Vía de administración: Vía oral

Modo de empleo:

Se debe administrar la cantidad necesaria de comprimidos, de acuerdo al peso del animal, en una sola toma y en conjunto o posterior a la comida. Los comprimidos contienen un sabor a carne y de fácil administración, y tanto perros como cachorros, usualmente aceptan de forma voluntaria el comprimido (incluso sin comida).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

En la raza Collie o sus mezclas el margen de seguridad para Milbemicina oxima es más estrecho en comparación a otros perros, por lo que se debe seguir estrictamente la dosis recomendada de uso en este caso.

Ante la ausencia de estudios específicos, no se recomienda su uso en perros severamente debilitados ni con grave disfunción hepática o renal.

CONTRAINDICACIONES

No usar en perros con un peso menor a 5 kg.
No administrar a animales hipersensibles a Milbemicina oxima o praziquantel.
No administrar en periodo de gestación, lactancia, ni en animales reproductores.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

En muy raras ocasiones, signos de tipo sistémicos (como: letargia), neurológicos (como: temblor muscular y ataxia), y/o gastrointestinales (como: vómitos, diarrea, anorexia y babeo), podrían observarse posterior a la administración.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACION

Estuche de cartón impreso con 1 blíster conteniendo 2 comprimidos.

Venta Bajo Receta Medico Veterinaria.

USO VETERINARIO

