

# VIRBAC MILPRO® 4 MG/10 MG.

Milbemicina oxima 4 mg + Praziquantel 10 mg.

Antiparasitario – Comprimido Oral.

REG. SAG N° 2457 - B

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene  
Milbemicina Oxima 4 mg  
Praziquantel 10 mg  
Excipientes c.s.p. 1 Comprimido



## ESPECIE DE DESTINO

Gatos desde 0,5 a 2 kg de peso

## INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de la infestación endoparasitaria mixta de cestodos (*Dipylidium caninum* y *Echinococcus multilocularis*) y nematodos (*Ancylostoma tubaeforme* y *Toxocara cati*).

## DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

La dosis corresponde a 2 mg de Milbemicina oxima y 5 mg de Praziquantel/kg peso corporal. La dosis de producto según peso del gato, es la siguiente:

Peso (KG)	N° de comprimidos
0,5 - 1 kg	1/2 comprimido
>1 - 2 kg	1 comprimido

La frecuencia de administración es en dosis única de tratamiento.

Vía de administración: Vía oral

Modo de empleo:

Se debe administrar la cantidad necesaria de comprimidos, de acuerdo al peso del animal, en una sola toma y en conjunto o posterior a la comida. Para facilitar su administración los comprimidos cuentan con un recubrimiento sabor a carne.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Ante la ausencia de estudios específicos, no se recomienda su uso en gatos severamente debilitados ni con grave disfunción hepática o renal.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar en gatitos menores a 6 semanas de edad.  
No administrar en gatitos o gatos con un peso menos a 0,5 kg.  
No administrar a animales hipersensibles a Milbemicina oxima o Praziquantel.

## EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

En muy raras ocasiones (y en especial en gatos jóvenes), signos de tipo sistémicos (como: letargia), neurológicos (como: temblor muscular y ataxia) y/o gastrointestinales (como: vómitos y diarrea), podrían observarse posterior a la administración del producto.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.  
En caso de utilizar ½ comprimido, mantener la otra mitad dentro de su envase original hasta su próximo uso, por un periodo máximo de 6 meses.

## PRESENTACION

Estuche con 1 blíster conteniendo 2 comprimidos.

**Venta Bajo Receta Medico Veterinaria.**

## USO VETERINARIO

