



VIRBAMEC® L.A.

Ivermectina 1%

Antiparasitarios – Solución Inyectable

REG. SAG N° 586-B

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contienen:

Ivermectina 1 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos.

INDICACIONES DE USO

Virbamec® LA está indicado en el tratamiento y control de parasitosis internas y externas de los bovinos, causadas por:

Parásitos gastrointestinales (formas adultas y estados larvarios)

- *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*
- *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*
- *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*
- *Cooperia pectinata*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*
- *Bunostomum phlebotomum*
- *Nematodirus helvetianus* (adulto), *Nematodirus* spp.
- *Oesophagostomum* spp.
- *Trichuris ovis*

Parásitos pulmonares

- *Dictyocaulus viviparus* (incluyendo formas inhibidas)

Ectoparásitos

- **Piojos:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Salenopotes capillatus*
- **Ácaros:** *Psoroptes communis* var. *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosis: 1 mL de Virbamec® LA para 50 kg de peso vivo, equivalente a 200 µg de Ivermectina por kg de peso vivo. Dosis única.

Vía de administración: Administrar por vía subcutánea.

Modo de empleo: Agitar antes de usar. Administrar en forma aséptica. Dividir las dosis que exceden 10 mL y aplicar en 2 sitios de inyección diferentes.

CONTRAINDICACIONES

No administrar por vía intramuscular ni intravenosa.

No administrar a otras especies animales, ya que puede producirse reacciones severas incluso la muerte en perros.

No administrar en terneros menores de 16 semanas de edad.

EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Se puede presentar una inflamación transitoria en el sitio de inyección, la cual remite sin necesidad de tratamiento.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 49 días.

No administrar en vacas cuya leche esté destinada a consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar. Conservar en su envase original, bien cerrado.

Una vez abierto el producto, utilizar dentro de 30 días y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento mencionadas. Luego de este periodo, descartar el producto sobrante.

PRESENTACIÓN

Frascos de 50, 100, 200 y 500 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO



Antiparasitarios

FT0129NAC25082023R2V2

Fabricado por
Virbac México S.A. de C.V.
Av. Inglaterra N° 5070, Guadalajara Technology Park C.P. 45010
Zapopan, Jalisco, México.

Importado y distribuido por
Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos, Santiago - Chile
Teléfono: (56 2) 2583 7700 / Fax: (56 2) 2583 7701
e-mail: ventas@virbac.cl ; www.virbac.cl
Bajo licencia de Laboratorios Virbac México S.A. de C.V.

