VIRKON ™ S AMARILLO

Desinfectante Polvo 45,3%

REGISTRO ISP N° D-285/21

COMPOSICIÓN

Monopersulfato de potasio al 45,3% p/p.

INDICACIONES

Virkon™ S Amarillo oxida los enlaces químicos de azufre en proteínas y enzimas, interrumpiendo la función de la membrana celular y así causando la ruptura de la pared.
Es utilizado para el control efectivo de virus, bacterias, hongos y levaduras en equipamiento y superficies.
Comprobó ser efectivo en más de 100 pruebas a nivel mundial contra:

- Los principales virus que afectan a hombres y animales.
- Las principales bacterias: Salmonella, Campylobacter, Listeria, *E. coli, S. aureus*, etc.
- Hongos: Aspergillus, Candida, Tricophyton y Microsporum.

DOSIFICACIÓN

Uso	Preparación de la solución	Aplicar a un promedio de
DESINFECCIÓN FINAL Para la desinfección de instalaciones o superficies de alto riesgo.	1:100 (1%)	300 cm^3 de solución por m^2
EQUIPOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Al aplicar Virkon™ S Amarillo con mochila de espalda o pulverizadoras. Para ser usado en baños de inmersión de partes de equipos.	1:200 (0,5%) hasta 1:100 (1%)	300 a 400 cm^3 de solución por m^2 (Enjuagar con agua potable después de 10 minutos de aplicado el producto).
PEDILUVIOS Y RODILUVIOS	1:100 (1%)	Renovar la solución cada 4 días o cuando esté muy sucia.
DESINFECCIÓN AÉREA Para la desinfección ambiental de instalaciones, galpones o bodegas	1:200 (0,5%)	Aplicar la cantidad suficiente como para llenar la atmósfera con un vapor fino a una tasa de 1 L de solución cada 100 m^3 de espacio aéreo.

PRECAUCIONES

Se recomienda el uso de guantes, ropa protectora, mascarilla y/o gafas de seguridad, durante la manipulación del producto. Evite su liberación al medioambiente. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños.
El producto no se debe disponer o aplicar bajo ninguna circunstancia, en el medio ambiente acuático (Art. N° 142, Ley de Navegación N° 2.222/78).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco con la tapa herméticamente cerrada. Eliminación: realice el triple lavado de los envases antes de eliminarlos. No reutilice los envases. No mezclar con otros químicos, excepto aquellos recomendados por el fabricante. Al producirse contacto prolongado con superficies metálicas, enjuagar con agua limpia. Enjuagar bien el equipo utilizado para la aplicación después del uso. Sacar a los animales, alimentos e implementos de las instalaciones a desinfectar. Ventilar luego de la aplicación y evitar el ingreso mientras se está aplicando el producto.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 kg.

FT0035NAC17102019R2V2

Manufacturado por
Antec International
Windham Road, Chilton Ind Est.
Sudbury, Suffolk CO10 2XD
Reino Unido.
Tel: +44 (0) 1787 377305
e-mail: biosecurity@lanxess.com
www.virkon.com

Importado y distribuido por
CENTROVET LTDA.
Salomon Sack 255, Cerrillos – Santiago.
Código Postal: 9201310. Chile.
Teléfono: (56-2) 25837700
Fax: (56-2) 25837701
e-mail: centrovet@centrovet.com
www.centrovet.com